



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina

Unidad de Posgrado

“Frecuencia y características clínicas de la patología dual en adultos, hospitalizados en la DEIDAE de Adicciones del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi” en el periodo 2005-2010”

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para optar el Título de Especialista en Psiquiatría

AUTOR

Noemi Paola BRAVO SAAVEDRA

ASESOR

Carlos A. SAAVEDRA CASTILLO

Lima, Perú

2014

Frecuencia y características clínicas de la patología dual en adultos hospitalizados en la DEIDAE de Adicciones del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado – HideyoNoguchi" en el período 2005 -2010.

AUTOR: Noemí Paola Bravo Saavedra

ASESOR: Dr. Carlos A. Saavedra Castillo

RESUMEN

Introducción: La presencia de dos o más trastornos mentales en el mismo paciente recibe el nombre de comorbilidad.

Cuando dicha comorbilidad es debida a la ocurrencia de un trastorno por abuso de sustancias asociado a otro trastorno psiquiátrico, recibe el nombre de patología dual. La existencia de comorbilidad psiquiátrica en las adicciones toma especial relevancia puesto que en diferentes estudios han constatado que la presencia de la psicopatología asociada es un factor de mal pronóstico.

Se desea determinar cuál es la frecuencia y características clínicas de patología dual en pacientes hospitalizados en la DEIDAE de Adicciones del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado-HideyoNoguchi" durante el período 2005-2010

Método: Se revisaron todas las historias clínicas de los pacientes hospitalizados en la DEIDAE de adicciones del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado-HideyoNoguchi" durante el período 2005-2010, obteniéndose un total de 375 pacientes. Los datos de estas historias clínicas fueron recolectados usando la ficha de recolección de datos elaborada por el autor

Resultados: La frecuencia de patología dual en pacientes hospitalizados en la DEIDAE de Adicciones del INSM fue 61.8%, más elevada en mujeres (82.7%).

La comorbilidad más frecuentemente encontrada fue la depresión seguida por la esquizofrenia y en el eje II el trastorno de personalidad psicopática seguido por el trastorno de personalidad limítrofe.

Así mismo se observó que el 24.5% de los pacientes con patología dual tienen como antecedente algún familiar con consumo de drogas y un 28.9% tienen como

Frecuencia y Características Clínicas de la Patología Dual en adultos hospitalizados
en la DEIDAE de Adicciones del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio
Delgado-HideyoNoguchi” en el período 2005-2010

antecedente algún tipo de trastorno psiquiátrico; siendo los más frecuentes la esquizofrenia y la depresión.

Conclusiones: La frecuencia de la patología dual en pacientes hospitalizados en la DEIDAE de adicciones es alta y comparable con otros estudios realizados.

Palabras Claves: *Patología Dual, Dependencia a drogas, Trastornos Mentales*